

Conferentie 30 oktober 2019
De Nieuwe Liefde | Amsterdam

Preventie van suïcidaal gedrag bij jongeren: *het moet en kan beter!*

Leer deze dag over alle mogelijke aspecten van effectieve hulpverlening aan suïcidale jongeren en hun ouders plus nieuwe behandel-mogelijkheden.

Accreditatie

NIP K&J | NVO | SKJ
NVvP
FGzPt

aangevraagd
aangevraagd
aangevraagd

www.zonderzorg.nl/congres/suicidepreventie



Programma

09.00 - 09.30	Inschrijving en koffie/thee	
09.30 - 09.35	Welkom & Lezing	<i>Ad Kerkhof</i>
09.35 - 10.10	Lezing: Hulpverleners aan suïcidale jongeren: hetzelfde en toch anders	<i>Jan Meerdinkveldboom</i>
10.10 - 10.30	Lezing: Het bondgenootschap van hulpverleners en naasten en nabestaanden.	<i>Ad Kerkhof en Ida Bontius</i>
10.30 - 11.00	Lezing: De zoektocht naar zelfzorg: Diagnostiek en behandeling van zelfverwondend gedrag	<i>Laurence Claes</i>
11.00 - 11.30	Pauze	
11.30 - 12.45	Workshopronde 1*	
12.45 - 13.45	Lunchpauze	
13.45 - 15.00	Workshopronde 2*	
15.00 - 15.15	Pauze	
15.15 - 16.30	Workshopronde 3*	
16.30 - 16.45	Plenaire afsluiting	<i>Ad Kerkhof</i>
16.45 - 17.15	Napraten en netwerkborrel	

Deze conferentie vindt plaats om het verschijnen van de herziene druk van het Handboek Suïcidaal Gedrag bij Jongeren (BOOM) te vieren. Een aantal auteurs verzorgt een lezing of een workshop. Onderzoekers, hulpverleners, naasten en nabestaanden en ervaringsdeskundigen zullen een bijdrage leveren.

Na een plenaire inleiding door Jan Meerdinkveldboom over hulpverlening aan suïcidale jongeren en een lezing over de ervaring van nabestaanden door Ad Kerkhof en Ida Bontius (Ivonne van der Ven Stichting) volgt de lezing Zelfbeschadigend Gedrag door Laurence Claes.

Aansluitend kun je drie workshops volgen. De workshops zullen zowel trainingsgericht als kennisgericht zijn.

Lezing 1: Jan Meerdinkveldboom

Hulpverleners aan suïcidale jongeren: hetzelfde en toch anders.

In deze lezing wordt aan de hand van de Multidisciplinaire Richtlijn uiteengezet op welke wijze suïcidale jongeren, anders dan volwassene, benaderd en behandeld moeten worden. Het betrekken van hun ouders is daarbij essentieel. De centrale cognities 'ik doe er niet mee toe' en 'ik ben iedereen tot last', staan hierbij voorop.

Lezing 2: Ad Kerkhof en Ida Bontius


Het bondgenootschap van hulpverleners en naasten en nabestaanden.

Behandeling van suïcidaliteit kan niet zonder een goede samenwerking tussen hulpverleners en familie. Hulpverleners hebben de familie nodig voor informatie over de patiënt, over zijn verleden, over zijn karakter, over zijn teleurstellingen. Hulpverleners hebben de familie nodig voor het bijhouden van schommelingen in de gemoedstoestand en voor bescherming van de patiënt. Familieleden hebben de hulpverleners nodig om symptomen te begrijpen, om onderliggende stoornissen te begrijpen, en om te weten wat ze moeten doen in tijden van crisis. Psychiaters hebben de familieleden nodig om goed bij te houden wat de effecten zijn van voorgeschreven medicatie of van verhoging of verlaging van de dosering. Psychologen hebben de familie nodig om de patiënt te leren dat het helemaal niet klopt als hij denkt dat ze zoveel last van hem hebben dat hij er maar beter niet meer kan zijn. Familieleden moeten weten wat ze moeten doen wanneer hun dochter in het weekend gaat zitten snijden in de armen. Daar hebben ze de hulpverleners bij nodig. Wat nog belangrijker is is dat zowel hulpverleners als familieleden eenzelfde benadering van de patiënt uitstralen: je bent de moeite waard en we willen je niet kwijt. Daarom is het essentieel in de behandeling van suïcidale patiënten dat hulpverleners en familie een bondgenootschap vormen om gezamenlijk de patiënt/dierbare te behandelen en te beschermen. Als je een suïcidale patiënt in behandeling krijgt, dan ben je er tegelijk verantwoordelijk voor om familieleden te helpen hun dierbare zo goed mogelijk te beschermen.

Lezing 3: Laurence Claes

De zoektocht naar zelfzorg: diagnostiek en behandeling van zelfverwondend gedrag.

In deze lezing staan we stil bij de definitie, de prevalentie, de functies en het verklaringsmodel van zelfverwondend gedrag bij jongeren. We bespreken eveneens de verschillen en de gelijkenissen tussen zelfverwondend gedrag en suïcidaal gedrag. We gaan na hoe we het zelfverwondend gedrag in kaart kunnen brengen en hoe we dit gedrag kunnen aanpakken. We staan stil bij motivatie tot behandeling, emotionele, cognitieve en gedragsmatige behandelstrategieën. Naast de behandeling van de cliënt, staat ook de interactie met het gezin centraal. Samen op zoek naar meer zelfzorg.



A person wearing black clothing and black sneakers with white soles is sitting on a concrete ledge. Their feet are resting on a metal railing. The background is a blurred outdoor setting with a yellow pipe and a brick wall. A purple semi-transparent banner is overlaid across the middle of the image.

Workshopronde 1

Workshopronde 1: 11.30 - 12.45 uur

In deze ronde kunt u **1** van deze workshops kiezen:

Steven Meijer


Begrijpen en behandelen van suicidaliteit vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader | ronde 1

In deze werkgroep wordt een fasemodel gebruikt (het motivationeel-intentioneel verklarend model van O'Connor) om de psychologische processen bij suicidaliteit te begrijpen. Dit model wordt geplaatst binnen een cognitief gedragstherapeutisch kader om van hieruit tot interventies te komen. Aandacht is er voor het onderscheid tussen acute en chronische suicidaliteit.

Laurence Claes

De aanpak van zelfverwondend gedrag in residentiële behandelcontext | ronde 1

In deze workshop bieden we concrete handvaten voor de aanpak van zelfverwondend gedrag in residentiële behandelcontext. Hoe kunnen we jongeren – individueel of in groep – helpen om het zelfverwondend gedrag beter te begrijpen en hoe kunnen we hen helpen om gezondere emotieregulatiestrategieën te ontwikkelen. Hoe gaan we om met thema's als wondverzorging, zorg voor littekens, besmettingsgevaar, sociale beïnvloeding, en hoe kunnen we voorkomen dat zelfverwondend gedrag evolueert naar suïcidaal gedrag, e.a.. Hoe gaan hulpverleners om met zelfverwondend gedrag van de jongeren die zij behandelen? Wat gebeurt er wanneer leden van het behandelteam geen gedeelde visie hebben over de aanpak van het gedrag. En hoe kan multidisciplinair werken, de zoektocht naar meer zelfzorg bevorderen ... We zoeken samen naar een antwoord ...



Workshopronde 1: 11.30 - 12.45 uur

Tobi Graafsma

“Je wil me toch niet zeggen dat je ...” | ronde 1

Samenwerken met suïcidale adolescenten is risky business. De paniek in de suïcidaliteit is doorgaans groot en suïcide wordt beschouwd als een reële oplossing. Daarom vereist elke aanpak een goede opleiding en training. In deze workshop combineren we een actieve, methodische aanpak met een psychoanalytische attitude – waarin hantering van overdracht en tegenoverdracht centraal staat.

Doel: versterken van een empathische en actieve, gestructureerde response op suïcidedreiging met een nadruk op hantering van tegenoverdracht.

Werkwijze: Korte uitleg en training aan de hand van lastige casuïstiek. Deelnemers worden uitgenodigd geanonimiseerde casuïstiek in te brengen.

Motto: “There is a crack, a crack in everything – that’s how the light gets in” (Leonard Cohen).

Jeroen Steenmeijer

Informatieverzameling en risicofactoren voor suïcide bij jongeren | ronde 1

Het is een van de meest voorkomende doodsoorzaken onder jongeren: suïcide. Als hulpverlener wil je je inspannen om het te voorkomen, maar toch blijft het als regen in een woestijn. Je weet dat het risico er is, maar het is moeilijk te voorspellen wanneer en hoe je er op voor te bereiden. In deze workshop worden risicofactoren besproken, wordt gekeken naar een gestructureerde manier van het verzamelen van informatie hierover en hoe tot een gewogen beoordeling van het risico en afweging in vervolgbeleid te komen. Want zeker bij suïcidaliteit geldt: liever te vaak een paraplu mee dan een nat pak.

Werkvorm: Multimodaal (quiz, presentatie, discussie/interactie)

A photograph of a man walking down a long, modern hallway. The hallway has a polished wooden floor and recessed ceiling lights. The man is wearing a dark jacket, a light-colored shirt, and jeans. A semi-transparent purple horizontal band is overlaid across the middle of the image, containing the text 'Workshopronde 2' in white. The right side of the image is blurred, suggesting a shallow depth of field or motion blur.

Workshopronde 2

Workshopronde 2: 13.45 - 15.00 uur

In deze ronde kunt u **1** van deze workshops kiezen:

Ineke Rood


De dood in de kamer: Stel je bent dood, wie zal jou het meeste missen | ronde 2

Als een jongere suïcidaal is stellen we doorgaans veel lineaire vragen die beginnen met hoe, wat, waarom, wanneer en deze vragen zijn nodig om de suïcidaliteit in te schatten. Echter bij circulaire vragen breng je een levendige en emotionele verbinding tot stand tussen de jongere en de context waarin deze leeft. Dit laatste zullen vooral we in deze workshop gaan oefenen.

Indra Boedjarath

Hoe behandel je suïcidale allochtone jongeren? | ronde 2

Wat doe je als een Hindoestaanse jongen aangeeft dood te willen? Wat doe je als een Turks meisje het leven niet meer ziet zitten, omdat ze dreigt uitgehuwelijkt te worden? In deze interactieve workshop krijgen hulpverleners (interculturele) handvatten aangereikt voor passende hulpverlening aan allochtone jongen met suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag.



Workshopronde 2: 13.45 - 15.00 uur

Nienke Hoekstra

Doorvragen naar suicidaliteit | ronde 2

De preventie van suïcide is een complexe zaak. Het omvat een veelheid aan factoren om tot een goede risicotaxatie en interventie te komen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt steeds meer eisen aan de rapportage en de verantwoording van suïcides in de GGZ. Suïcidecommissies signaleren regelmatig lacunes in het doorvragen naar suïcidaliteit, in de continuïteit van zorg en in kennis van risicofactoren.

Deze workshop is een korte basisintroductie in de vaardigheden benodigd in de omgang met suïcidale patiënten. Praktische oefeningen met rollenspelen voor hulpverleners m.b.t. doorvragen en begrijpen van suïcidale verlangens en empathisch invoelen van de wanhopige patiënt.

Jan Meerdinkveldboom

Complexe diagnostiek bij suïcidaal gedrag.... | ronde 2

In deze workshop onderzoeken we suïcidaal gedrag bij jongeren die tevens een psychiatrische stoornis hebben. Hoe beïnvloeden beide factoren elkaar, en wat betekent het voor de behandeling als er sprake is een depressie, een psychose, een eetstoornis of persoonlijkheidsproblematiek?



Semicolons always
bring hope,
hope that the
story isn't over yet,
hope to the ones
who chose to fight
instead of ending it all.



Workshopronde 3

Workshopronde 3: 15.15 - 16.30 uur

In deze ronde kunt u **1** van deze workshops kiezen:

Nienke Hoekstra + Jeroen Steenmeijer

Opnemen of niet | ronde 3


Opnemen of niet, dat is een vraag waar veel hulpverleners voor komen te staan. En waar allerlei partijen een andere mening over kunnen hebben, Verwijzers, crisisdienst, ouders, de aangemelde jongere zelf, familie, burens... in een situatie waarin de druk hoog is. Het gaat tenslotte over veiligheid. Welke criteria spelen een rol bij de beslissing tot wel of niet opnemen een rol, wat zegt de richtlijn, hoe zit het met bedden, hoe zit dat met vrijwillige en onvrijwillige opname.

Diana van Bergen

Suïcidaliteit bij LHTBI jongeren | ronde 3

In deze workshop worden deelnemers bekend gemaakt met de achtergronden van suicidaliteit bij LHBT jongeren, en worden zij uitgenodigd om te brainstormen over onmisbare elementen voor succesvolle behandelingen voor suicidaliteit in deze groep. Nederland kent wereldwijd een hoge mate van acceptatie van seksuele- en gender diversiteit, kijkend naar de houding van de algemene bevolking en de mate van rechtsgelijkheid. Echter, lesbische, homo- en biseksuele (LHB) jongeren doen 3 tot 5 keer vaker een zelfmoordpoging dan heteroseksuele jongeren; transgender (T) personen hebben 5 tot 10 maal zo vaak suïcidale gedachten. Stress en piekeren over hun seksuele- en genderidentiteit, en de (verwachte) reacties die zij (zullen) krijgen spelen een belangrijke rol bij suïcidaal gedrag in deze groep.

Op dit moment wordt er aan de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie een web-based interventie ontwikkeld om suicidegedachten- en pogingen onder LHBT-jongeren te verminderen.



Workshopronde 3: 15.15 - 16.30 uur

In deze ronde kunt u 1 van deze workshops kiezen:

Lenny Rodenburg

ABFT: in verbinding met de suicidale jongere | ronde 3

Attachment Based Family Therapy (ABFT) is een systemische behandelmethodiek, ontwikkeld door Guy Diamond en gebaseerd op inzichten uit de gehechtheidstheorie. Volgens deze theorie lopen kinderen en jongeren veel gevaar om depressieve klachten te ontwikkelen als er veel stress is in hun leven (thuis, op school, met vrienden) en ze het gevoel hebben dat ze daarover niet bij hun ouders (of andere zorgfiguren) terecht kunnen. Die problemen kunnen zo groot en uitzichtloos worden, dat ze op den duur gaan denken dat enkel zelfdoding nog een uitweg kan bieden. In deze methodiek ga je met de jongere en ouders aan de slag om jongeren te helpen met vertrouwen hun problemen te delen met hun ouders en om ouders te helpen hun kind of adolescent zo te ondersteunen dat die zich begrepen en gehoord voelt. In de workshop neem ik jullie mee aan de hand van een videocasus om in kleine groepjes te oefenen met de eerste fase van dit model: Relationele reframing. Hoe plaats je de somberheidsklachten of suicidaliteit in de relatie. Centrale vraag in deze methodiek is: "Wat maakt dat je, op het moment dat je je intens rot voelt en de dood je enige uitweg lijkt, je niet naar je ouders gaat voor hulp?" Een zelfmoordpoging is geen schreeuw om aandacht maar een uiting dat je al die pijn niet langer kunt verdragen en je daar zo intens alleen in voelt staan. Guy Diamond geeft aan: contact en je weer verbonden voelen is het beste medicijn.

Judith de Heus/ 113

Veiligheidsplan/ App backup | ronde 3

In deze workshop demonstreren we het gebruik van een veiligheidsplan in de praktijk van de ambulante en residentiële behandeling van suicidale jongeren. In het bijzonder demonstreren we het gebruik van de veiligheids app: BackUp van 113 die te downloaden is vanuit de App Store of Google Play op mobiele telefoon en Ipad. We vragen deelnemers voor aanvang van de workshop de app te downloaden op de eigen mobiel of Ipad. En zo mogelijk al een keer uit te proberen bij een eigen cliënt.

Zie: www.113.nl/ik-denk-aan-zelfmoord/backup